

এসিটা

প্যারাসিটামল

উপচাপন

এসিটা ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে প্যারাসিটামল বিপি ১০০ মি.গ্রা.।
 এসিটা ৩০ মি.লি. সাসপেনশন প্রতি ৫ মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে প্যারাসিটামল বিপি ১২০ মি.গ্রা.।
 এসিটা ১০০ মি.লি. সাসপেনশন প্রতি ৫ মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে প্যারাসিটামল বিপি ১২০ মি.গ্রা.।
 এসিটা ৩০ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস প্রতি ৫ মি.লি. ড্রপস এ রয়েছে প্যারাসিটামল বিপি ৮০ মি.গ্রা.।
 এসিটা এক্সটেন্ড ট্যাবলেট প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে প্যারাসিটামল বিপি ১০০০ মি.গ্রা.।

বিবরণ

এসিটা (প্যারাসিটামল) একটি দ্রুত কার্যকরী ও অধিকতর নিরাপদ বেদনানাশক ও জ্বর নিরাপক। যে সকল রোগীর ক্ষেত্রে এসপিরিন বা অন্যান্য বেদনানাশক সহনীয় নয় বা এসপিরিন ব্যবহারে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তাদের জন্য এসিটা বিশেষভাবে উপযোগী।

রোগ নির্দেশনা

জ্বর ও বেদনা উপশরের সব ক্ষেত্রে যেমন ব্যথা, মাসিকের ব্যথা, কানের ব্যথা, ঠান্ডা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শিশুদের টিকা নেওয়ার পরে জ্বর ও ব্যথা, মাঝু প্রাবাহ, মাঝুশূল, বাতের সমস্যাজনিত ব্যথা ইত্যাদিতে এটি সেবা।

মাত্রা ও সেবনবিধি

ডোজ ফর্ম	বয়স	ডোজ	পুনরাবৃত্তি
ট্যাবলেট	প্রাপ্তবয়সক (১০০ মি.গ্রা.)	১ ট্যাবলেট	প্রতি ৮-৬ ঘণ্টা
	(১০০ মি.গ্রা.)	২ ট্যাবলেট	প্রতি ৬ ঘণ্টা
	(৬৬৫ মি.গ্রা.)	২ ট্যাবলেট	প্রতি ৬-৮ ঘণ্টা
	(১০০০ মি.গ্রা.)	১ ট্যাবলেট	প্রতি ৬ ঘণ্টা
সাসপেনশন	প্রাপ্তবয়সকদের শিশু: ৩ মাস-১ বছর	৪-৮ চা চামচ	প্রতিদিন ৩ থেকে ৮ বার
	১-৫ বছর	৫/১ চা চামচ	প্রতিদিন ৩ থেকে ৮ বার
	৬-২২ বছর	১-২ চা চামচ	প্রতিদিন ৩ থেকে ৮ বার
		২-৪ চা চামচ	প্রতিদিন ৩ থেকে ৮ বার
পেডিয়াট্রিক ড্রপ	০ থেকে ৩ মাস	০.৫ মি.লি.	৮ বার
	৪ থেকে ১১ মাস	১.০ মি.লি.	৮ বার
	১ থেকে ২ বছর	১.৫ মি.লি.	৮ বার
	২-৩ বছর বয়স	২ মি.লি.	৮ বার
	৪-৫ বছর বয়স	৩ মি.লি.	৮ বার

প্রতি নির্দেশনা

যে সকল রোগীর যকৃতের (ভাইরাসজনিত যকৃতের প্রদাহ) এবং মূলের তৈরি গোলযোগ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল দেয়া যাবে না।

পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া

প্যারাসিটামল এর পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণত হালকা হয়, যদিও প্রোথেসাইটোপেনিয়া, লিঙ্গোপেনিয়া, প্যারাসিটোপেনিয়া, নিউট্রোপেনিয়া এবং আমালোকাইটেসিস হেম্যাটোলিজিক্যাল প্রতিক্রিয়াগুলি হতে পারে। অন্যান্য প্রদাহ, তুলো ফ্লুসকৃতি এবং অন্যান্য আলার্জি প্রতিক্রিয়া মাঝে সংরক্ষিত।

যকৃত বা বুকীয় অঞ্চলতা সম্পর্কে রোগীদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল সর্তৰকতার সাথে ব্যবহার করা। উচিত। যকৃতের ফিলার উপর প্রভাব বিভাগকারী অন্যান্য ঔষুধের সাথে প্যারাসিটামল সাবধানতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

অতিরিক্ত

অত্যধিক মাত্রায় গ্রহণ করলে বমনেচ্ছা, ব্রিম, ফ্যাকাশে ভাব, শুধুমানদা, লিভারের ক্ষতি এবং তলপেটে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। প্যারাসিটামলের মাত্রাধিকের ফলে রক্তে হৃৎকারের অধিক্য অথবা স্থৱীয় দেখা দিতে পারে।

বাণিজিক মোড়ক

এসিটা ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতিটি বারে রয়েছে ১০টি ট্যাবলেটের ২০টি ব্রিস্টার প্যাক।
 এসিটা ৬০ মি.লি. সাসপেনশন প্রতি এ্যাথার কালার কাঁচের বোতলে রয়েছে ৬০ মি.লি. সাসপেনশন।
 এসিটা ১০০ মি.লি. সাসপেনশন প্রতি এ্যাথার কালার কাঁচের বোতলে রয়েছে ১০০ মি.লি. সাসপেনশন।
 এসিটা ৩০ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস প্রতি এ্যাথার কালার কাঁচের বোতলে রয়েছে ৩০ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস।
 এসিটা এক্সটেন্ড ট্যাবলেট প্রতিটি বারে রয়েছে ১০টি ট্যাবলেটের ১০টি ব্রিস্টার প্যাক।
 এসিটা ওয়ান ট্যাবলেট প্রতিটি বারে রয়েছে ১০টি ট্যাবলেটের ১০টি ব্রিস্টার প্যাক।

অত্যধিক:

ব্রাকোফ্রামা
লি. সি. চেটি ড
এ-১১৬, বিসিসি সিল নগরী
চট্টগ্রাম, পাঞ্জাবদেশ

এই গ্রন্থ ব্যবহারের সম্মত আগমন যদি কিন্তু জ্বরের থাকে, তাহলে নির্বাচিত চিকিৎসক
অথবা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ নিন।

Aceta

Paracetamol

Presentation

Aceta 500 mg Tablet: Each tablet contains Paracetamol BP 500 mg.

Aceta 60 ml Suspension: Each 5 ml Suspension contains Paracetamol BP 120 mg.

Aceta 100 ml Suspension: Each 5 ml Suspension contains Paracetamol BP 120 mg.

Aceta 30 ml PD: Each 5 ml Drops contains Paracetamol BP 80 mg.

Aceta Extend Tablet: Each tablet contains Paracetamol BP 665 mg.

Aceta One Tablet: Each tablet contains Paracetamol BP 1000 mg.

Description

Aceta (Paracetamol) is a fast acting and safe analgesic with marked antipyretic property. It is specially suitable for patients who, for any reason, can not tolerate aspirin or other analgesic.

Indications

All conditions requiring relief from pain and fever such as neuritis, neuralgia, headache, earache, toothache, pain due to rheumatic disorder, cold, influenza, dysmenorrhoea, post-vaccination pain & fever of children etc.

Dosage and administration

Dosage form	Age group	Dose	Frequency
Tablet	Adults (500 mg) (500 mg) (665 mg) (1000 mg)	1 tablets 2 tablets 2 tablets 1 tablets	Every 4-6 hours Every 6 hours Every 6-8 hours Every 6 hours
	Adults	4-8 teaspoonful	3 to 4 times daily
	Children: 3 months-1 year	½ to 1 teaspoonful	3 to 4 times daily
	1-5 years 6-12 years	1 to 2 teaspoonful 2 to 4 teaspoonful	3 to 4 times daily 3 to 4 times daily
Suspension	0 to 3 months	0.5 ml	4 times
	4 to 11 months	1.0 ml	4 times
	1 to 2 years	1.5 ml	4 times
	2 to 3 years	2 ml	4 times
	4 to 5 years	3 ml	4 times
Paediatric Drops			

Contraindications

Paracetamol is contraindicated in patients with severe renal function impairment and hepatic disease (Viral Hepatitis).

Side effects

Side effects of Paracetamol are usually mild, though haematological reactions including thrombocytopenis, leukopenia, pancytopenia, neutropenia, and agranulocytosis have been reported. Pancreatitis, skin rashes, and other allergic reactions occur occasionally.

Precautions

Paracetamol should be given with care to patients with impaired kidney or liver function. Paracetamol should be given with care to patients taking other drugs that affect the liver.

Overdosage

Symptoms of Paracetamol overdose in the first 24 hours are pallor, nausea, vomiting anorexia and abdominal pain. Liver damage may become apparent 12 to 40 hours after ingestion. Abnormalities of glucose metabolism and metabolic acidosis may occur.

Commercial pack

Aceta 500 mg Tablet: Each box contains 20 blister packs of 10 tablet.

Aceta 60 ml Suspension: Each amber colored glass bottle contains 60 ml of Suspension .

Aceta 100 ml Suspension: Each amber colored glass bottle contains 100 ml of Suspension.

Aceta 30 ml PD: Each amber colored glass bottle contains 30 ml of Paediatric Drops.

Aceta Extend Tablet: Each box contains 10 blister packs of 10 tablet.

Aceta One Tablet: Each box contains 10 blister packs of 10 tablet.

Manufactured by
BIOPHARMA
LTD
A-116, BSCC, Industrial Estate
TONGI, GAZIPUR, BANGLADESH

For further query on the use of this medicine, consult to a registered Doctor or Pharmacist.